

Seconde		Fiche d'exercices 1
	Généralités sur les fonctions	

Exercice 1

Traduire symboliquement par une égalité les phrases suivantes :

Exemple : (-5 est l'image de 4 par la fonction g) équivaut à ($g(4) = -5$).

- a. 2 a pour image 0 par la fonction f b. un antécédent par h de -3 est 5
c. les images de -3 et 5 par g sont nulles d. -4 est un antécédent de 2 par la fonction u
e. 46 est l'image de 12 par la fonction v f. un antécédent par la fonction f de -8 est 17

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x^2$.

1. Que peut-on dire de l'ensemble de définition de f ? Calculez les images par f des réels 0; $\sqrt{2}$; -4.
2. Vérifiez que 4 a deux antécédents par f . Pourquoi -4 n'est-il l'image d'aucun réel?
3. Quels sont les réels qui ont $\frac{5}{4}$ pour image par f ?

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2 - 5x$.

1. Factorisez $f(x)$.
2. Calculez $f(0)$; $f(1)$; $f(-2)$; $f(\sqrt{3})$; $f\left(\frac{4}{3}\right)$.
3. Déterminez par calcul les antécédents de 0.

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = (2x + 6) - (x + 3)^2$.

1. Développez puis factorisez $f(x)$.
2. En choisissant l'expression la mieux adaptée (développée ou factorisée), calculez à la main les images de 0; $\sqrt{2}$ et $\frac{-1}{2}$.
3. Déterminez par calcul le ou les antécédents de 0 et -3 par f .







Exercice 5

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x-3}{x+5}$.

1. Quelle est la valeur interdite? En déduire l'ensemble de définition de la fonction g .
2. Calculez à la main les images de 0; $\sqrt{2}$ et $\frac{-1}{2}$.
3. Calculez le ou les antécédents par g de 0; 1 et -3.

Exercice 6


Dire si les représentations graphiques données sont, oui ou non, des représentations de fonctions :



Seconde		Fiche d'exercices 2
	Généralités sur les fonctions	

Exercice 7

La courbe ci-dessous est la courbe représentative d'une fonction f .



Corrigez les erreurs du tableau de valeurs :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	-2	0	-2	-5,5	-5	-0,5

Exercice 8

On considère la fonction f définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = \frac{x^2}{x+5}$.

Les points suivants sont-ils sur la courbe représentative de f :

$O(0;0)$; $A\left(1; \frac{1}{6}\right)$; $B\left(3; \frac{1}{5}\right)$; $C\left(-2; \frac{4}{7}\right)$; $D\left(-3; \frac{9}{2}\right)$?

Exercice 9

On considère la fonction g définie sur $[-4 ; 2]$ par $g(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 3$.

1. Remplir le tableau de valeurs suivant :

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
$g(x)$							

2. Tracez sur papier millimétré la courbe représentative de la fonction f (on choisira un repère orthogonal (O, I, J) tel que $OI = OJ = 4$ cm).

3. A l'aide du graphique, déterminez une valeur approchée :


a) des images de 1,5 et -1,5

b) du ou des antécédents de $-\frac{1}{2}$

4. Retrouvez les résultats par calcul.

Exercice 10


Soit f une fonction dont on donne la courbe représentative ci-dessous :



1. Par lecture graphique, donnez l'ensemble de définition de f .
2. Donnez les images $f(-4)$, $f(-3)$, $f(0)$, $f(3)$ et les antécédents de 2,5 et -5.
3. Repassez en rouge les points de la courbe dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 1. Donnez l'ensemble des abscisses de ces points.
4. Donnez l'ensemble des abscisses des points de la courbe dont l'ordonnée est strictement plus petite que 1.

Exercice 11

Soit f une fonction dont la courbe représentative (C) est donnée ci-dessous :



Répondre aux questions en utilisant le graphique et en justifiant votre démarche :

1. a. Déterminez l'image de 2 par f . b. Déterminez $f(0)$, $f(1)$ et $f(-2)$.
2. a. Résoudre $f(x) = -2$. b. Déterminez les antécédents de 2 par f .
3. a. Résoudre $f(x) \leq 2$ b. Résoudre $f(x) > 0$


4. Dressez le tableau de variation de f sur D

5. Quels sont les extrema locaux de la fonction f ? En quels points sont-ils atteints ?

Seconde		Fiche d'exercices 3
Généralités sur les fonctions		

Exercice 12

La courbe représentative C de la fonction f a l'allure ci-dessous. Répondre en utilisant le graphique, avec la précision que permet sa lecture.




1. Quel est l'ensemble de définition D de f ?
2. Déterminer l'image par f de : 2 ; -2 et 0. Faire une phrase pour répondre et donner les égalités correspondantes.
3. Déterminer les antécédents éventuels de 5 et $-\frac{2}{3}$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 2$, puis les inéquations $f(x) > -3$ et $f(x) \leq 1$.
5. Pour quelles valeurs de k l'équation $f(x) = k$ a-t-elle trois solutions ? zéro solution ?
6. Quel est l'ensemble des images de l'intervalle $[-2 ; 1]$?


Exercice 13

Soit f la fonction définie sur

- 1) Soit C_f et C_g les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-2,5 ; 2]$.
 - a) Dressez les tableaux de variations des fonctions f et g . Précisez les extrema éventuels.
 - b) Résoudre graphiquement $f(x) > 0$; $g(x) < 0$; $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$.



2) Soit C_f et C_g les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-3,5 ; 2]$.
Mêmes questions qu'au 1).



Exercice 14

On considère trois récipients de forme différente, de même hauteur 10 cm et de même capacité. On remplit chaque récipient d'une hauteur x de liquide. Ceci permet de définir trois fonctions, égales à la contenance de chaque récipient en fonction de x . On donne ci-dessous les récipients, les courbes, les tableaux de valeurs et les formules des trois fonctions en question.

- Les récipients

A

B

C
- Les courbes
- Les tableaux de valeurs

x	0	2	4	6	8	10
$f(x)$	0	4,189	33,51	113,1	268,1	523,6
$g(x)$	0	104,7	209,4	314,2	418,9	523,6
$h(x)$	0	255,5	410,5	490,1	519,4	523,6
- Les formules
 - $V_1(x) = \frac{\pi x^3}{6}$;
 - $V_2(x) = \frac{50\pi x}{3}$;
 - $V_3(x) = \frac{\pi}{6}(x^3 - 30x^2 + 300x)$.


1. Associer à chaque récipient sans l'aide de calculatrice, une courbe, un tableau de valeurs et une expression algébrique, en précisant les critères qui ont permis cette association.

- Vérifier les résultats annoncés à l'aide d'une calculatrice.
- En utilisant les représentations graphiques, construire des jauges pour chacun des récipients, gradués en pourcentage du volume total (avec un pas de 10%)

Seconde		Fiche d'exercices 4
	Généralités sur les fonctions	

Exercice 15

La figure ci-dessous représente un récipient en forme de cône tronqué ayant pour dimensions :



- diamètre de base 5 cm
- diamètre d'ouverture 20 cm
- hauteur 30 cm

On verse de l'eau à une hauteur h ; nous admettrons que le volume de liquide correspond est

donné par la formule suivante : $V(h) = \frac{\pi}{48} h^3 + 30h^2 + 300h$ exprimé en cm^3 .

- Calculer le volume total de ce récipient.
- Quel est le volume rempli lorsque le niveau de l'eau est à mi-hauteur ? Ce volume est-il la moitié du volume total ?
- Construire un tableau de valeurs et la courbe à l'aide de la calculatrice.
- Utiliser la calculatrice pour déterminer le niveau de liquide correspondant à un volume rempli égal à la moitié du volume total.

Exercice 16

$BEAU$ est un rectangle tel que $BE = 8$ et $EA = 6$.

Le point M se déplace de E vers U sur les côtés $[EA]$ et $[AU]$ du rectangle.

On note x la distance parcourue par le point M depuis le point de départ E , et $f(x)$ la distance BM .

- Compléter en justifiant les phrases suivantes :
 - Si M est au milieu de $[EA]$, alors $x = 3$ et $f(x) = \dots\dots$
 - Si M est au milieu de $[AU]$, alors $x = 10$ et $f(x) = \dots\dots$
- Quel est l'ensemble de définition de f ?
- A l'aide de considérations géométriques, dresser le tableau de variation de f .

Exercice 17

On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 6$ et $AD = 4$.

Sur le côté $[CD]$, on place un point I tel que $DI = 2$.

Un point M parcourt le trajet $ABCD$ en restant toujours sur les côtés du rectangle.

On veut étudier les variations de la distance MI en fonction de la distance parcourue x par le point M depuis son point de départ A .

On pose $MI = f(x)$.

- Effectuer le placement des points $M_2, M_5, M_7, M_{10} \dots$ correspondant respectivement aux valeurs $x = 2, x = 5, x = 7, x = 10, x = 13, x = 20$.

2. Sur chacun des intervalles suivants, dire si la distance MI augmente ou diminue lorsque x augmente : $[0; 2]$, $[2; 6]$, $[6; 10]$, $[10; 14]$, $[14; 16]$, $[16; 20]$.
3. En déduire le tableau de variation de la fonction f .
4. Compléter le tableau de variation en calculant MI pour x prenant successivement les valeurs 0, 2, 6, 14, 20. Préciser les maximum et minimum de cette fonction sur $[0; 20]$

Exercice 18

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = 3x^2 + 6x - 1$.

1. Afficher sur l'écran de la calculatrice la courbe de f puis par lecture, proposer une valeur du minimum m .
2. Calculer $f(x) - m$, puis vérifier que pour tout réel x , $f(x)$ est supérieur à m .
3. Autre calcul
 - a. Vérifier que pour tout réel x , $3(x+1)^2 - 4 = 3x^2 + 6x - 1$.
 - b. En déduire l'existence d'un minimum de f que l'on précisera.

Exercice 19

Soit f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - x + 5$.

1. Quel semble être le maximum de f sur \mathbb{R} ? (Tracer la courbe à l'aide de la calculatrice) Exprimer $6 - f(x)$ en fonction de x . En déduire le maximum de f sur \mathbb{R} et en quelle valeur il est atteint.